

C

Indicaciones: **-cejas:** corrección de diseños de cejas defectuosos, levantamiento de la cola de la ceja, mejora de la simetría entre las cejas, mejora del visagismo del rostro, relleno en cejas despobladas, corrección de cicatrices. **-Labios:** recuperación del contorno en labios desdibujados, mejora de la simetría en labios desiguales, camuflaje de arrugas peribucales, mejora de la flacidez mediante la corrección de comisuras, rejuvenecimiento del rostro, perfilado y relleno, mejora del volumen en personas de edad, mejora de la expresión. **-Ojos:** aumento visual de la densidad de pestañas, corrección de la línea del ojo, embellecimiento del ojo con eye-liner, mejora de la expresión del ojo, mejora de la simetría. **-aplicaciones paramédicas:** reconstrucción de areolas mamarias, corrección de acromías e hiperacromías, mejora de cicatrices capilares, camuflaje de cicatrices, repigmentación de vitíligos, diseño de cejas después del trat. cancer. -Otras: lunares, pecas, micro decorativa. **Contraindicaciones:** **-Absolutas (no realizar):** reacción alérgica a los pigmentos, queloides, lunares, angiomas, verrugas, hemofilia, medicación con anticoagulantes, cicatrices no estabilizadas. **-Bajo supervisión médica:** diabetes, sida, cardiopatías medicadas con anticoagulantes, enfermedades tipo infeccioso, enfermedades psíquicas no estabilizadas. **-Relativas (realizar cuando terminen):** menstruación, dermatitis local, epilepsia, embarazo, herpes, infecciones locales, debilidad inmunológica, cáncer, infiltraciones. **Documentos técnicos:** elaboración de un historial médico del cliente, derivación a otros profesionales, prueba de sensibilidad, información al cliente, cuidados anteriores y posteriores, consentimiento del cliente, elaboración de la ficha técnica, registro diligenciado. **Cuidados anteriores:** 1 evitar cualquier tipo de excitante (coca cola, té), 2 evitar aspirinas alcohol y cualquier tipo de vasodilatador o anticoagulante 24 h antes de la micro, 3 no tomar el sol ni rayos UVA, 4 no comer marisco ni picante porque pueden facilitar reacciones en la piel por el ácido úrico, 5 si la micro es en ojos y lleva lentillas se le recomendará quitarlas. **Cuidados posteriores:** 1 limpiar la zona una vez al día con suero fisiológico, 2 durante la primera semana evitar usar maquillaje, cremas, 3 mantener la zona bien seca, después de lavarla, 4 no frotar ni rascar durante la cicatrización, 5 evitar ambientes cargados porque favorecen las infecciones, 6 evitar saunas, piscinas y playas hasta la cicatrización, 7 evitar la expo. al sol o rayos UVA. **-EN OJOS:** evitar conducir en las horas posteriores de la micro, aplicar frío en la zona, evitar lentillas un par de días, no emplear ningún tipo de maquillaje durante 7 días hasta la completa cicatrización. **-EN LABIOS:** evitar fumar horas después, evitar comidas muy picantes, mantener la zona limpia y seca, consultar al médico si aparecen herpes, evitar maquillarse durante la primera semana.