

Orto 3

Die Zahl ist durch Überkapazitäten oder Mängel, wenn man von der fehlenden Zähne Agenesie und ob mehr Zähne als überzählige oder hyperdontia Anomalien in diesen Erbanlagen gegeben spielt eine wichtige Rolle.

vorzeitigen Verlust der Zähne. verändern den Umfang und Zahnbogen Symmetrie dieser kann durch Karies, Wurzelresorption und iatrogenia verursacht werden. im Falle der verlorenen Zeit verloren geht Platzhalter, den Leitfaden d Eruption, halten Sie die Gegner in einem normalen Okklusion, im Falle eines bleibenden Gebiss umfasst die Verkürzung des Bogens, kippen d benachbarter Zähne auf Eruption und d-Antagonisten d Abweichung zahnärztliche Mittellinie. im Falle von Verlust Faktoren, die iatrogenicos parodontalen Entzündung, kann Frühkontakt q unteren Abweichungen verursachen und erhöhte Kau-Lasten auf den Zahn, die durch den Verlust des Zahnes kann.

agliteraciones parodontalen: ENF. aktiven parodontalen und unbehandelt kann Zahnverlust aufgrund der großen destrucion Ursache d d unterstützenden Strukturen, die uns die Entwicklung einer Anomalie führt

Klassifizierung der Winkel.

Klasse 1 Dysgnathie oder normocclusion: Normal ap Beziehung zwischen Kiefer sup. und inf. wo die mesio bukkalen Höcker des 1. Molaren sup. verschlossen in der mittleren Schädelgrube vestibulären 1. Molaren inf. und die Spitze des Hunde-sup. verschließt in der Scharte dl Eckzähne und Prämolaren 1. inf.

Genese: allgemeine Faktoren, Genetik (Diskrepanz zwischen Zahn-und Kieferbereich size = Verdrängung), Entwicklung (im Sinne von Zahn-und Kiefer Größe MD) Diät (Nahrung + weich, verarbeitet hipofucionalismo = Muskel) lokale Faktoren (= überzählige Zähne Verdrängung oder Asymmetrie, Verlust dental = mesogresion und Veränderungen der Form, Größe und Anzahl)

Features: skelettalen Beziehungen, molaren und Hunden normal, gerade oder harmonischen Profil, spezifische Zahnprobleme.

Klasse 1-Anomalie mit vertikalen Probleme: Veränderung in der normalen senkrechten beißen = 2mm: **offenen Bisses** (Finger Saugen, Schlucken und Zunge Zwischenschaltung atypisch, Behandlung, um die Gewohnheit zu korrigieren und die vordere Zahnreihe begrenzt. **Tiefbiß** (Stufe d vorderen Schneidezähne, d vorzeitigen canine lingual Verschiebung führten zu vorübergehenden .= inf inf d Schneidezähne., inf vorderen Verdrängung bestehen kann., d mit extrudierter Schneidezahnposition assoziiert und erhöht die Länge oder das Eindringen der hinteren Segment