

# tac y eco

**2))CERVICALES: AP:** •1)Bipe o DS con brazos a los costados, colocar la cabeza de modo k si trazamos una línea k pasara x el plano oclusal de los dientes hasta los extremos de las apófisis mastoides esta sea perpendicular al receptor de imag. •2) 15-20º craneal a la altura del margen inferior del cartílago tiroides (4 vertebra cervical). **Lateral:** •1)Bipe o sedestación, con el hombro apoyado en el portachasis vertical. Aconsejar al pac k mov los hombros hacia abajo y adelante, elevando levemente el mentón para prevenir la superposición entre las ramas de la mandibula y las primeras vertebra cervicales. •2)Perpendicular al RI, centrado en c4 (borde superior del cartílago tiroides). **Flexion Lateral:** •1)Bipe, Colocar al pac en una pos lateral pura, solicitando k se relaje y baje los hombros hasta dnd pueda. Descender el mentón para tocar el torax (o hasta donde tolere el pac) •2)Perpendicular la receptor de imag centrado a la altura de C4 (extremo superior del cartílago tiroides). **Extension Lateral:** •1)Bipe, brazos a los costados colocando al pac en pos pura, solicitando k se relaje y k baje los hombros hasta dnd pueda. Levantar mentón y desplazar la cabeza en dirección ala espalda hasta dnd tolere el pac. 2)"". **OPD/OPI:** •1)Bipe o sedestación, como alternativa a las anteriores colocar en pac en decúbito. Rotar cuerpo y cabeza 45º elevando ligeramente el mentón para evitar k el maxilar inferior se superponga con las primeras vertebra. •2)Altura de C4. **TRANSBUCAL:** •1)Bipe o DS, con brazos a los costados y cabeza apoyada sobre el chasis. Abrir boca lo max posible y situar la cabeza, de modo k el borde inferior de los dientes superiores este alineado con base del cráneo. •2)En la boca, el pac debe abrir la boca para ver odontoides a través del cielo de la boca. **DORSAL: AP:** •1)Bipe o DS, con brazos a los costados. Flexionar rodillas y caderas para reducir curvatura torácica. •2)Perpendicular al RI centrado en la 7 vertebra torácica (T7), situada a 8-10cm x debajo de escotadura yugular. **Lateral:** •1)Bipe o DL, con piernas flexionadas, colocando soporte entre rodillas. Elevar brazos hasta formar angulo 90º con el cuerpo, flexionando los codos. Colocar soporte debajo de cintura para k columna se situe paralela a la mesa. •2)Perpendicular al RI, a nivel axilar, pac se coloca en DL pero un poco posterior. Centrado en T7, situada a 8-10cm x debajo de la oscotadura yugular o la altura del extremo distal de escapula.